

Приложение 9. Критерии качества специализированной медицинской помощи детям при другой пролиферативной ретинопатии (ретинопатии недоношенных) (код по МКБ-10: [H35.2](#))

Критерии качества специализированной медицинской помощи детям при другой пролиферативной ретинопатии (ретинопатии недоношенных) (код по МКБ-10: [H35.2](#))

N п/п	Критерии качества	Оценка выполнения
1.	Выполнена офтальмоскопия и/или биомикроскопия глазного дна в условиях мидриаза	Да/Нет
2.	Выполнено первичное офтальмологическое обследование с медикаментозным мидриазом, включающее офтальмоскопию глазного дна и/или биомикроскопию с/без применения ретинальной камеры на 3 - 4 неделе жизни ребенка (31 - 34 неделя постконцептуального возраста)	Да/Нет
3.	Проведен мониторинг течения ретинопатии недоношенных в декретированные сроки в зависимости от клинических проявлений РН (еженедельно, раз в две недели)	Да/Нет
4.	Проведена коагуляция сетчатки не позднее 72 часов от момента установления диагноза (при "пороговой стадии")	Да/Нет
5.	Выполнена коагуляция аваскулярной сетчатки (не менее 70% площади аваскулярных зон)	Да/Нет
6.	Выполнена офтальмоскопия глазного дна врачом-офтальмологом через 7 - 10 дней после коагуляции сетчатки	Да/Нет
7.	Достигнута стабилизация процесса (уменьшение признаков плюс-болезни, прекращение роста экстраретинальной пролиферации) через 7 - 10 дней после проведенной коагуляции сетчатки	Да/Нет
8.	Проведена оценка эффективности лечения и определение клинических исходов ретинопатии недоношенных через один месяц после коагуляции сетчатки	Да/Нет